

POMOCNÝ PROSTŘEDEK NA OCHRANU ROSTLIN
Uváděný na trh podle nařízení o vzájemném uznávání 2019/515
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití

BRACONTOP®

Biologický prostředek (bioagens) s živými juvenilními stádii vosičky *Bracon hebetor* k ochraně zemědělských komodit ve skladech, silech, mlýnech, pekárnách i domácnostech před skladištními škůdci.

Název a množství účinné složky:	<i>Bracon hebetor</i>
P102	Uchovávejte mimo dosah dětí
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv
P501	Odstraňte obsah/obal předáním do domovního odpadu
EUH401	Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí
Držitel povolení:	ANW Nützlinge GmbH, Ausserhalb 54, 643 19 Pfungdstat, Německo
Osoba odpovědná za konečné označení pomocného prostředku:	BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., Mayerova 784, 664 42 Modřice, tel: 545 218 156, www.biocont-profi.cz
Číslo šarže/ datum výroby formulace:	uvedeno na obalu
Doba použitelnosti:	1 týden ode dne dodání, teplota skladování 12-16 °C
Množství pomocného prostředku v obalu:	40 ks, 200 ks v PVC tubě

Způsob působení: vosička *Bracon hebetor* je parazitoid, který parazituje larvy hostitelských druhů jako jsou skladištní škůdci. Samička vosičky nabodne larvu čímž ji usmrtí, a poté na ni klade vajíčka. Infikované larvy škůdců jsou zdrojem potravy pro vyvíjející se vosičky. Larva Bracon se po čase zakuklí, a tak vzejde nová generace parazitických vosiček, která vyhledává další larvy škůdců. Tím dochází k jejich redukci.

Návod k použití:

1) plodina, oblast použití	2) škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Poznámka k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
Sklady obilnin, mlýny, pekárny, sila, domácnosti, sklady krmiv	Skladištní škůdci: Zavíječ moučný, zavíječ paprikový , zavíječ skladištní, zavíječ voskový, zavíječ čokoládový	40 ks / 50 m ²	AT		4) preventivně
Sklady obilnin, mlýny, pekárny, sila, domácnosti, sklady krmiv	Skladištní škůdci: Zavíječ moučný, zavíječ paprikový, zavíječ skladištní, zavíječ voskový, zavíječ čokoládový	40 ks / 10–20 m ²	AT		4) kurativně

OL (dny) – ochranná lhůta je dána odstupem mezi termínem aplikace a sklizní; AT – jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují

Plodina, oblast použití	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
Sklady obilnin, mlýny, pekárny, sila, domácnosti, sklady krmiv	Otevření nádobky v prostoru	Po dobu výskytu škůdce	2–4 týdny

Upřesnění použití:

- Parazitická vosička Bracon se orientuje podle pachu larev škůdců.
- Doporučujeme aplikaci již při teplotách od 16–35 °C, kdy optimum pro vosičku je při 18–30 °C, v období od dubna do konce září na volně ložené skladované komodity.
- Je také možné aplikovat do prázdných prostor po jejich mechanickém vyčištění a před naskladněním a následně pak použít bioagens již jen v hotspotech.
- První aplikaci doporučujeme do prázdných vyčištěných skladů a následně pak opakovat po 2-4 týdnech.
- Parazitickou vosičku Bracon proti larvám lze použít současně s vosičkou Trichogramma která napadá vajíčka škůdců
- Pro stanovení termínu zahájení ošetření a stupně zamoření daných prostor použijte feromonové lapače.

Další omezení: nebyla stanovena

Osobní ochranné pracovní prostředky: Dodržují se běžná hygienická a bezpečnostní opatření pro práci s prostředky na bázi makroorganismů, používejte běžné osobní ochranné prostředky. Při práci s bioagens nejzte, nepijte, nekuřte. Po práci si umyjte ruce vodou a mýdlem. Produkt neohrožuje zdraví lidí, nepoškozuje životní prostředí.

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny:	vyhledání lékařského ošetření pouze přetrvávají-li zdravotní potíže.
Nadýchání při aplikaci:	nepředpokládá se
Zasažení kůže:	zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem.
Zasažení očí:	vyplachujte čistou vlažnou tekoucí vodou.
Náhodné požití:	vypláchněte ústa vodou a vypijte sklenici vody, nevyvolávejte zvracení.

Skladování: Je možné krátkodobé uložení v uzavřených originálních obalech na suchém, chladném místě při teplotě cca 12-16 °C. Bioagens nesmí být nikdy vystaven teplotám pod bodem mrazu či nad 30°C. Skladování je možné po dobu nejvýše 1 týdne ode dne dodání. Nedoporučuje se skladovat společně s

chemickými přípravky ochrany rostlin a těkavými látkami. Skladujte mimo dosah dětí a odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Bioagens musí být použito před datem expirace.

Likvidace obalů a zbytků: Použité obaly lze likvidovat jako domovní odpad.

Další údaje a upřesnění: ---

Příprava aplikační kapaliny: ---

Čištění zařízení pro aplikaci pomocného prostředku: ---

Upozornění:

Před použitím bioagens si přečtěte příložené pokyny. Riziko za poškození vyplývající z faktorů ležících mimo dosah kontroly výrobce nebo distributora nese spotřebitel. Za škody vzniklé nevhodným skladováním anebo nevhodným použitím bioagens výrobce ani distributor neručí.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství.

BIOCONT LABORATORY – biologická ochrana rostlin