

SANDEZIA® SUCHÁ DEZINFEKCE™

BIOCIDNÍ PŘÍPRAVEK určený k dezinfekci budov pro chov hospodářských zvířat
Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena

Účinná látka: sodná sůl N-chlor-4-methylbenzen-1-sulfonamidu 2,5 g/kg (0,25 %) CAS 127-65-1

Forma přípravku: prášek

Složení: minerální látky, éterické oleje z eukalyptu

EUH208 Obsahuje sodnou sůl N-chlor-4-methylbenzen-1-sulfonamidu. Může vyvolat alergickou reakci.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte prach. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / protiprachovou masku. P501 Odstraňte obsah / obal předáním oprávněné osobě.

Postupujte podle pokynů na štítku. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte štítek a informace o přípravku.

Bezpečnostní opatření: nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky ani v případě požití zvířaty – přípravek je vyroben na bázi minerálních látek. Přípravek nesmí být míchán s vápnem, sodou ani s jinými zásadami. Při aplikaci nejezte, nepijte, nekuřte. Kontaminovaný oděv před dalším použitím vyperte.

První pomoc: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Pokud máte kašel a astmatické dýchací potíže a nedochází k rychlému zlepšení, vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa pitnou vodou. Vypít dostatek chladné vody. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při ZASAŽENÍ OČÍ: Ihned vyplachujte min 15 minut při široce rozevřených očích čistou tekoucí vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Vyhledejte lékařskou pomoc.

Další postup první pomoci lze konzultovat s TIS: telefon nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402.

Působení: přípravek intenzivně suší mokrou podestýlku, čímž zabraňuje přeměně močoviny na amoniak a uvolňování škodlivých plynů. Přípravek udržuje nízké pH a zabraňuje tak růstu patogenních mikroorganismů. Je vhodný pro dezinfekci budov pro chov hospodářských zvířat, dopravních prostředků pro přepravu zvířat a zařízení pro výrobu krmiv. Přípravek je určen do chovů prasat, skotu, koní, drůbeže, norků, králíků, ovcí a psů.

Dávkování, návod k použití:

- Rovnoměrně posypte dezinfikovaný povrch jednou týdně dávkou 50 g/m²
- Při prvním použití přípravku SANDEZIA první 3 dny aplikujte 50 g/m² každý den, následně pak jednou týdně
- Před umístěním podestýlky použijte 50–100 g/m² přípravku (dle její výšky), následně jednou týdně posypte podestýlku množstvím 50 g/m²
- V případě zvýšeného rizika výskytu onemocnění je doporučena častější aplikace přípravku SANDEZIA, např. 2 - 3x týdně v celém kotci, především pak v blízkosti míst podávání krmiva a vody.
- Použití pro „suchou koupel“ selat ihned po narození – urychluje proces hojení ran a odřenin; chrání před průjmem a onemocněními.
- Pro dezinfekci stěn a hůře dostupných míst ve formě vodní suspenze rozpustíte přípravek v poměru 1 kg přípravku na 1,5 litru vody. Spotřeba: 1,5 l/15 m² povrchu.
- Dezinfekci lze provádět v přítomnosti zvířat. Hrst dospělé osoby má kapacitu přibližně 50 g přípravku. Balení postačuje na dezinfekci 500 m² povrchu.
- Používejte pravidelně!

Skladování: Skladujte v originálním neprodyšně uzavřeném obalu v pokojové teplotě na suchém místě v dostatečné vzdálenosti od potravin.

Povolení č. 6992/17

Datum výroby a číslo šarže: 01. 06. 2023

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Výrobce: Sandezia Sp. z o. o.; Zabrzeż 248; 33 390 Łącko, Polsko

e-mail: info@sandezia.com; www.sandezia.com

Balení **25 kg**