

Biologický larvicid účinný na larvy komárů.

Formulace: ve vodě dispergovatelné granule (WG)

Účinná látka: *Bacillus thuringiensis israelensis* sérotyp H-14; kmen AM65-52 37,4 % w/w

P280 Používejte vhodné ochranné rukavice /ochranný oděv. **P261** Zamezte vdechování prachu.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. **P501** Odstraňte obsah/obal předáním odpovědné osobě.

EUH208 Obsahuje *Bacillus thuringiensis*. Může vyvolat alergickou reakci.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Návod k použití: VectoBac WG je selektivní mikrobiální insekticid na regulaci larev komárů pro použití v různém přírodním prostředí. Aktivní látka biocidu VectoBac WG účinkuje požerově, a proto musí být biocid aplikován v larválních stádiích L1 až L4, kdy larvy komárů aktivně přijímají potravu. Objem vody se pohybuje 2,5 – 1000 l/ha v závislosti na aplikačním zařízení, Ledové granule: 5 – 30 l/ha. Aplikace postřikem je možná pozemně nebo letecky. Pozemní aplikace: přenosný tlakový postřikovač s čerpadlem, pojízdňné motorizované postřikovací zařízení; letecká aplikace: letoun nebo vrtulník s aplikačním zařízením na ledové granule. VectoBac WG před aplikací nechte dispergovat ve vodě

Bezpečnostní opatření: Při práci s biocidem VectoBac WG používejte vhodné OOPP a zajistěte dostatečné větrání: Ochrana dýchacích orgánů: plynová maska s filtrem P3. Ochrana těla a rukou: ochranný oděv, rukavice z chemicky odolného materiálu. Ochrana očí a obličeje: uzavřené brýle nebo obličejový štít. Ochrana nohou: gumové nebo plastové hlinky.

Během aplikace výrobku až do umytí rukou nepijte, nejezte ani nekuřte. Po použití přípravku si umyjte ruce a přímo zasaženou pokožku. Přípravek nesmí být používán osobami s primární nebo sekundární imunodeficiencí ani osobami léčenými přípravky, které potlačují imunitní reakce.

Zamezte vstupu do mísa aplikace, a to až do zaschnutí postřiku.

Vectobac® WG

Biocidní insekticidní přípravek

Typ 18

Pro profesionální použití

Výrobce:

Valent BioSciences Corporation,
870 Technology Way,
Libertyville 60048, USA

Držitel registrace:

Sumitomo Chemical Agro Europe
SAS, rue de la Voie lactée, 69370 Saint
Didier au Mont d'Or, Francie

® Registered trademark of Sumitomo Chemical Agro Europe

Číslo povolení: CZ-0011381-0000

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby při teplotě skladování 5 – 25°C

Datum výroby: uvedeno na obalu

Číslo šarže: uvedeno na obalu

Balení:

25 Kg

Doporučené dávkování pro vodní plochy s výskytem larev komárů

Oblast použití	Aplikační dávka
Larvy komárů (L1-L4) Venkovní použití – povrchové vody, septiky, záchytné jímky, odpadní vody	0,125 – 0,5 kg/ha* Max 8x Interval 10 dnů
Larvy komárů (L1-L4) Venkovní použití – povrchové vody, septiky, záchytné jímky, odpadní vody – vysoké znečištění	0,5 – 1,0 kg/ha* Max 8x Interval 10 dnů

*Aplikační dávka závisí na míře infestace, čistotě vody a míře výskytu 4. instaru larev komárů a intenzitě výměny vody.

Doba účinku přípravku: 24 hodin po aplikaci

Aplikace: postřikem pozemně nebo letecky.

Široká veřejnost musí být o letecké aplikaci informována příslušným způsobem, a to před, během a 48 hodin po ošetření. Při letecké aplikaci je třeba dodržet ochrannou vzdálenost o šířce 50 m mezi místem aplikace a obytnými oblastmi. Letecká aplikace je vhodná pro plochy větší než 0,5 ha.

První pomoc: Všeobecné pokyny: Projeví-li se zdravotní potíže při úrazu, nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z této etikety či příbalového letáku. V případě potřeby lze konzultovat s **Toxikologickým informačním střediskem:** telefon nepřetržitě: **224 919 293 nebo 224 915 402.** Zasažení očí: Při otevřených víčkách vyplachujte zejména prostor pod víčky vodou po dobu 10 - 15 min. Přetrvávají-li příznaky, vyhledejte lékaře. Nadýchání: Postiženého přemístěte na čerstvý vzduch. Požítí: Nevyvolávejte zvracení, podejte 10 rozdrcených tablet medicínálního uhlí a nezbytné množství pitné vody k zapití.

