


POMOCNÝ PROSTŘEDEK NA OCHRANU ROSTLIN
Uváděný na trh podle nařízení o vzájemném uznávání 2019/515
Před použitím si přečtěte příložený návod k použití

WETCIT®

Postřikový pomocný prostředek – adjuvant/smáčedlo pro zlepšení funkce insekticidů, akaricidů, fungicidů, herbicidů, pomocných přípravků a kapalných hnojiv – určený pro použití v zemědělství a zahradnictví

Název a množství účinné složky:	Ethoxylované alkoholy 8,15 % (83,5 g/l)	 VAROVÁNÍ
Název nebezpečné látky:	Alkoholy, C11-15-sekundární, ethoxylované (CAS no.: 68131-40-8); Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfátované, sodné soli (CAS no.: 68891-38-3)	
H315	Dráždí kůži	
H319	Způsobuje vážné poškození očí	
H412	Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky	
P273	Zabraňte uvolnění do životního prostředí.	
P280	Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.	
P302+P352	PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.	
P305+P351+P338	PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou – li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování	
P501	Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě.	
EUH401	Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.	
EUH208	Obsahuje pomerančovou silici. Může vyvolat alergickou reakci	
SP1	Neznečišťujte vody přípravkem nebo jeho obalem. (Nečistěte aplikační zařízení v blízkosti povrchových vod./ Zabraňte kontaminaci vod splachem z farem a cest).	
SPe3	Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržáním neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchové vodě.	
OP II. st.	Přípravek není vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemních a povrchových vod.	
Držitel povolení:	Oro Agri International Ltd., Bankastraet 75, 9715 CJ Groningen, Nizozemsko	
Osoba odpovědná za konečné balení a označení:	Oro Agri International Ltd., Bankastraet 75, 9715 CJ Groningen, Nizozemsko	
Evidenční číslo pom. prostředku:	neuveďeno	
UFI:	NVA8-S0KR-N005-2C0D	
Číslo šarže/ datum výroby formulace:	Uvedeno na obalu	
Doba použitelnosti:	2 roky od data výroby; teplota skladování +5 °C až +25 °C	
Množství přípravku v obalu:	5 l a 10 l coex HDPE/PA kanystr	

Způsob působení: Pomocný přípravek WETCIT je adjuvant s penetračními vlastnostmi určený do tank mixu s většinou přípravků na ochranu rostlin, pomocných přípravků a kapalných hnojiv používaných v zemědělství, zahradnictví a péči o travnaté plochy. Při správném použití WETCIT příznivě ovlivňuje smáčivost a přilnavost aplikační kapaliny, omezuje úlet postřiku. WETCIT také umožňuje lepší distribuci i na ty části rostlin, které nejsou při aplikaci přímo zasaženy

Návod k použití:

1) plodina, oblast použití	2) škodlivý organismus, jiný účel použití	Dávkování, mísitelnost	OL (dny)	Poznámka 1) k plodině 2) k ŠO 3) k OL	4) Poznámka k dávkování 5) Umístění 6) Určení sklizně
Orná půda, polní plodiny, ovocné stromy, vinice, travní porosty	zlepšení smáčivosti a přilnavosti aplikačních kapalin, snížení úletu postřiku	0, 15 – 0,3 %	AT		4) TM – mimo morforegulatorů a přípravků obsahujících rostlinné oleje

Zahrady, zahradní plodiny	zlepšení smáčivosti a přilnavosti aplikačních kapalin, snížení úletu postřiku	0, 15 – 0,3 %	AT		4)TM – mimo morforegulatorů a přípravků obsahujících rostlinné oleje
---------------------------	---	---------------	----	--	--

AT – jde o způsob použití nebo určení, které stanovení ochranné lhůty nevyžadují.

Ochranná lhůta se řídí přípravkem na ochranu rostlin, se kterým je pomocný prostředek míchán.

Plodina, oblast použití	Dávka vody	Způsob aplikace	Max. počet aplikací v plodině	Interval mezi aplikacemi
Zahrady, zahradní plodiny	podle použitého přípravku na ochranu rostlin	postřik, rosení	podle použitého přípravku na ochranu rostlin	podle použitého přípravku na ochranu rostlin
Orná půda, polní plodiny, ovocné stromy, vinice, travní porosty	podle použitého přípravku na ochranu rostlin		podle použitého přípravku na ochranu rostlin	podle použitého přípravku na ochranu rostlin

Upřesnění použití:

WETCIT je určen pro tank mix s povolenými přípravky na ochranu rostlin, pomocnými přípravky a kapalnými hnojivy, kromě přípravků obsahujících rostlinné oleje a morforegulatorů. Použití a ochranná doba se řídí přípravkem, pomocným přípravkem či kapalným hnojivem se kterým je WETCIT míchán. Řiďte se také pokyny uvedenými na etiketách produktů použitých pro TM. Před použitím ověřte reakci rostlin po ošetření na omezeném vzorku rostlin. V případě pochybností si vyžádejte informace u výrobce. Doporučujeme aplikovat v dopoledních hodinách nebo večer (vyhnout se vysokým teplotám). Neaplikujte až do začátku odkapávání, a to zejména v počátečních fázích jádrového ovoce, třešní, stolních hroznů. Vzhledem k velké variabilitě výrobků, se kterými je adjuvant smíchán doporučujeme ověřit si reakci na malém vzorku rostlin před velkoplošnou aplikací. V případě míchání WETCIT s výrobky ve formulaci EC a/nebo obsahujícími chlorpyrifos dbejte zvýšené opatrnosti u plodin běžně citlivých na tyto sloučeniny. Při použití v souladu s doporučeným dávkováním, jak je uvedeno na této etiketě, není výrobek fytotoxický. Při použití v souladu s doporučením na této etiketě je WETCIT neškodný pro užitečné členovce. WETCIT je adjuvant určený do tank mixu, a proto pečlivě dodržujte také pokyny a doporučené dávkování k danému produktu, se kterým je adjuvant míchán.

Ochranné vzdálenosti a jiná opatření a omezení s ohledem na zdraví lidí, necílových organismů a složek životního prostředí:

SPe3 Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržáním neošetřeného ochranného pásma 5 m vzhledem k povrchové vodě.

Další omezení:

Postřikujte jen za bezvětří nebo při mírném vánku, v tom případě po větru ve směru od dalších osob. Při aplikaci nesmí být zasaženy jiné porosty v okolí ošetřované plochy. WETCIT je aplikovatelný běžnými pozemními postřikovači a rosiči, které zajistí rovnoměrné dávkování. Dávka aplikační kapaliny je závislá na použitém přípravku na ochranu rostlin. Vstup na ošetřené pozemky je možný minimálně druhý den po aplikaci

Při manipulaci s prostředkem, po skončení práce, až do odložení pracovního oděvu a dalších OOPP a do důkladného umytí, nejezte, nepijte a nekuřte. Při manipulaci s WETCIT-em nepoužívejte kontaktní čočky. Pracovní oděv a OOPP před dalším použitím vyperte, resp. očistěte. Poškozené OOPP je třeba urychleně vyměnit.

Práce s pomocným prostředkem je nevhodná pro alergické osoby, zakázaná pro těhotné a kojící ženy a mladistvé

Osobní ochranné pracovní prostředky:

Ochrana dýchacích orgánů:	není nutná
Ochrana rukou:	gumové nebo plastové rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí podle ČSN EN 420+A1 s uvedeným kódem podle přílohy A k ČSN EN 374-1.
Ochrana očí a obličeje:	ochranné brýle nebo ochranný štít podle ČSN EN 166.
Ochrana těla:	celkový ochranný oděv např. podle ČSN EN 14605+A1 nebo podle ČSN EN 13034+A1, popř. podle ČSN EN ISO 13982-1 nebo jiný ochranný oděv označený piktogramem „ochrana proti chemikáliím“ podle ČSN EN ISO 13688.
Dodatečná ochrana hlavy:	není nutná.
Dodatečná ochrana nohou:	pracovní nebo ochranná obuv (např. gumové nebo plastové holínky) podle ČSN EN ISO 20346 nebo ČSN EN ISO 20347 (s ohledem na práci v zemědělském terénu).
Společný údaj k OOPP:	poškozené OOPP (např. protřžené rukavice) je nutné urychleně vyměnit.

Při práci s adjuvancem WETCIT používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP), případně se používají ochranné prostředky podle rizikovějšího přípravku směsi tank mixu.

Informace o první pomoci:

Všeobecné pokyny:	Projeví-li se přetrvávající zdravotní potíže (nevolnost, slzení, zarudnutí, pálení očí; nebo podezření na alergickou kožní reakci apod.) nebo v případě pochybností kontaktujte lékaře.
První pomoc při nadýchání aerosolu při aplikaci:	Přerušete expozici. Přejděte mimo ošetřovanou oblast. Nebo dopravte postiženého mimo ošetřovanou oblast.
První pomoc při zasažení kůže:	Odložte kontaminovaný / nasáklý oděv. Zasažené části pokožky umyjte, pokud možno teplou vodou a mýdlem, pokožku následně dobře opláchněte. Při větší kontaminaci kůže se osprchujte.
První pomoc při zasažení očí:	Vyplachujte oči alespoň 10 minut velkým množstvím vlažné čisté vody při rozevřených víčkách. Pokud jsou nasazeny kontaktní čočky a pokud je to možné, vyjměte je. Kontaminované kontaktní čočky nelze znovu používat a je třeba je zlikvidovat.

První pomoc při náhodném požití:	Ústa vypláchněte vodou, případně dejte postiženému vypít sklenici (¼ litru) vody; nevyvolávejte zvracení.
Při vyhledání lékařského ošetření informujte lékaře o pomocném prostředku, se kterým se pracovalo, poskytněte mu informace ze štítku, etikety nebo příbalového letáku a o poskytnuté první pomoci. Další postup první pomoci (i event. následnou terapii) lze konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem: Telefon nepřetržitě: 224 919 293 nebo 224 915 402.	

Skladování: Skladujte v suchých a chladných místnostech. Doba použitelnosti je 2 roky od data výroby při teplotě skladování 5°C až 25°C v původních neporušených obalech. Uchovávejte odděleně od skladovaných potravin, nápojů a krmiv, hnojiv, desinfekčních přípravků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem a přímým slunečním svitem. Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé nesprávným skladováním výrobku.

Likvidace obalů a zbytků: Vyprázdněný obal vymyjte vodou a likvidujte jako ostatní odpad. Nepoužitý pomocný prostředek v původním obalu a prázdné obaly odevzdejte předáním oprávněné osobě. Obaly od pomocného prostředku se nesmí znovu používat pro jakékoli jiné účely! Technologický zbytek postřikové kapaliny a nepoužité zbytky postřikové kapaliny s přípravkem na ochranu rostlin zneškodněte podle pokynů na etiketě přípravku na ochranu rostlin, se kterým se pomocný prostředek aplikoval.

Další údaje a upřesnění:

Výrobce: Oro Agri International Ltd., Bankastraat 75, 9715 CJ Groningen, Nizozemsko

Příprava aplikační kapaliny: Postupujte podle návodu na přípravu postřikové kapaliny přípravku na ochranu rostlin. Naplňte nádrž postřikovače asi na 90 % požadovaného množství postřikové kapaliny; za stálého pomalého míchání přidejte potřebné množství smáčedla WETCIT a doplňte vodou na požadovaný objem. Připravený naředěný roztok musí být spotřebován do 12 hodin. Pomocný prostředek WETCIT zvýšeně pění.

Čištění zařízení pro aplikaci přípravků: Po vyprázdnění nádrže aplikační zařízení (nádrž, ramena, trysky) vypláchněte vodou (1/4 objemu nádrže postřikovače. Opakujte 2x. V případě čisticích prostředků postupujte dle návodu k jejich použití. Trysky a sítko musejí být čištěny odděleně před a po proplachování. Pokud návod k použití pesticidu obsahuje odlišný způsob čištění aplikačního zařízení, dodržujte způsob uvedený v daném návodu.

Přípravek, u něhož prošla doba použitelnosti, lze uvádět na trh po dobu 1 roku, jestliže se prokáže na základě analýzy odpovídajícího vzorku, že se jeho chemické a fyzikální vlastnosti shodují s vlastnostmi, ne jejichž základě bylo uděleno povolení. Laboratorní rozbor pro tento účel zajistí držitel povolení u laboratoře akreditované v členském státě Evropské unie. Držitel povolení je povinen prodlouženou dobu použitelnosti vyznačit na obalu přípravku a tuto skutečnost oznámit Ústavu do 5 dnů ode dne provedení změny na obalu přípravku.

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství

BIOCONT LABORATORY – biologická ochrana rostlin